

PRIMEIROS SOCORROS

O QUE NÃO FAZER?

- ✗ Não amarrar ou utilizar torniquete
- ✗ Não aplicar qualquer tipo de substância no local
- ✗ Não cortar, perfurar ou apertar o local da picada
- ✗ Não dar alimentos ou bebidas alcoólicas a vítima
- ✗ Não tentar remover ferrões e/ou veneno

O QUE FAZER?

- ✓ Lavar o ferimento com água (corrente) ou água e sabão
- ✓ Manter a vítima calma
- ✓ Se possível, capturar o animal e levar para o serviço de saúde para uso do soro mais adequado
- ✓ Manter a vítima em repouso e elevar o membro acometido em casos de acidentes com serpentes
- ✓ Encaminhar-se ao Hospital Universitário Lauro Wanderlei - HULW (Referência em acidentes com serpentes, aranhas e escorpiões)
- ✓ Os demais casos de acidentes com animais peçonhentos, encaminhar-se para hospitais de urgência e emergência

COMO SE PREVENIR?

PARA ARANHAS E ESCORPIÕES



- Não acumule lixo e entulhos em sua casa ou no quintal
- Tape os buracos e frestas das paredes, rodapés e os ralos
- Sacudir roupas, sapatos e toalhas de banho antes de usá-las
- Verifique colchões e roupas de cama antes de deitar, afastando sempre as camas da parede
- Limpar as caixas de gordura regularmente
- Evitar propagação de insetos como baratas, pois servem de alimentos para ambos.

PARA SERPENTES



- Uso de botas de cano alto, peneiras e luvas em locais onde possam ocorrer cobras ou outros animais peçonhentos
- Não pegar objetos, frutas ou plantas no chão sem antes observar seus arredores
- Manter limpas as áreas ao redor da casa e plantações, evitando acúmulo de lixo e entulhos
- Evitar segurar cobras com as mãos, mesmo mortas, porque seu veneno permanece ativo por um certo tempo após a morte do animal
- Proteger os predadores naturais das serpentes, como: emas, siriemas, gaviões e corujas.

PLANTÃO PERMANENTE



☎ CIATox - BR: 0800 722 6001

☎ CIATox - JP: 3216-7007

📷 [ciatox_jp](#)

Os demais acidentes com animais e intoxicações o CIATox pode apenas orientar, mas as vítimas devem procurar Hospitais de Urgência e Emergência.

ANIMAIS PEÇONHENTOS



CIATox

JOÃO PESSOA - PB



Serpentes

Jararaca
(*Bothrops sp.*)




Sintomas: Dor, inchaço, sangramento na gengiva e nariz, náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão.
Tratamento: soros (SAB, SABC, SABL)

Cascavel
(*Crotalus sp.*)



Dormência local, mal-estar, sudorese, sonolência ou inquietação, dificuldade em abrir os olhos, diplopia, ptose palpebral, urina avermelhada.
Tratamento: soros (SAC, SABC)

Coral
(*Micrurus sp.*)



Sintomas: Discreta dor local, geralmente acompanha dormência, vômitos, fraqueza muscular, ptose palpebral, dificuldade para deglutir, insuficiência respiratória aguda e apneia.
Tratamento: soro SAE (soro anti-elapídico)

Tratamento

O tratamento para acidentes ofídicos normalmente depende de soro e de tratamento sintomático. Ao socorrer uma vítima de ofidismo, não faça torniquetes, não tente sugar a peçonha, apenas lave o local da picada, deite a vítima e a direcione a um serviço de saúde especializado.

Escorpiões

Escorpião Amarelo Do Nordeste
(*Tityus stigmurus*)



Tem tronco amarelo, apresenta uma linha escura nas costas. Sua picada provoca dor, semelhante a pontadas, podendo se irradiar por todo o membro é possível que também esteja associado a dormência. Crianças de até 7 anos e idosos são grupos de risco e podem apresentar sintomas sistêmicos como: náuseas, vômitos, febre cefaléias, dores abdominais.

Escorpião Amarelo
(*Tityus serrulatus*)



Essa espécie apresenta um tronco escuro, é considerado o mais peçonhento da América do Sul (É mais comum no Sul e Sudeste do Brasil). Os Sintomas de sua picada são semelhantes ao do *Tityus stigmurus*, entretanto, sua peçonha é mais potente e provoca acidentes mais graves.

Escorpião Marrom
(*Tityus bahiensis*)



Apresenta coloração marrom-escuro, às vezes marrom-avermelhado. É uma espécie típica do estado de São Paulo.

Tratamento

Não cortar, furar e nem apertar o local da picada. O tratamento é sempre prescrito por profissional competente e normalmente ocorre com analgésicos, bloqueio anestésico corticóides e soro anti-escorpiônico, em casos graves. Em caso de picadas, é recomendado a realização de compressa morna e se encaminhar a um serviço de saúde.

Aranhas

Aranha Marrom
(*Loxosceles*)



Sua picada é praticamente indolor, só aparecem marcas na pele por volta de 12-24 h, apresenta inchaço, vermelhidão, úlcera, febre, tremores, disfunção renal, coma e convulsão.
Tratamento: Soluções anti-septicas, anti-histamínicos, corticóides, analgésicos, soro anti-aracnídico ou anti-loxocélico. cirurgia plástica

Aranha Armadeira
(*Phoneutria*)



Dor imediata e intensa, sudorese local, sintomas sistêmicos, Choque neurogênico, priapismo, edema pulmonar agudo.
Tratamento: Analgésicos, infiltração local com lidocaína, soro anti-aracnídico.

Viúva-Negra
(*Latrodectus*)



Provoca dor, sudorese, urticária, prurido, convulsões, náuseas, vômitos, priapismo, dor abdominal intensa, choque hipovolêmico, insuficiência renal, parada respiratória.
Tratamento: analgésicos potentes, gluconato de cálcio, corticóides, anti-histamínicos e soro anti-latrodoectus.

Tratamento

Normalmente o tratamento para acidentes aracnídicos ocorre com analgésicos, corticóides, anti-histamínicos, infiltrações com lidocaína e soro anti-aracnídico.

Uma possível picada de aranha pode ser identificada pela presença de um halo avermelhado que se expande com o passar do tempo além de apresentar uma ferida no centro.