



PROCESSO SELETIVO PARA
RESIDÊNCIA MÉDICA - 2020

Nome do Candidato:

Inscrito na Especialidade:

OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA PROVA ESPECÍFICA (PE)

INSTRUÇÕES

- Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 questões de múltipla escolha;
- Caso não esteja completo, informe imediatamente o fiscal da sala. Não serão aceitas reclamações posteriores;
- Escreva seu nome completo e a especialidade a qual concorre, no campo indicado;
- Utilize caneta de tinta **azul ou preta**;
- Responda às questões de múltipla escolha na FOLHA OBJETIVA, no espaço indicado;
- Terminantemente proibida qualquer espécie de pesquisa;
- Terminantemente proibido o uso de aparelhos eletrônicos.

Boa prova!

QUESTÃO 01.

Sobre a maturação do colo uterino, utiliza-se, frequentemente, o índice de Bishop para a sua avaliação clínica. Fazem parte desta avaliação os itens abaixo, exceto:

- (A) Dilatação cervical.
- (B) Altura da apresentação fetal.
- (C) Esvaecimento cervical.
- (D) Linhas de orientação da apresentação fetal.
- (E) Consistência cervical.

QUESTÃO 02.

Na assistência ao parto pélvico, considere os itens:

- a) A manobra de Mauriceau está indicada para o despreendimento do polo cefálico.
- b) Existem três formas de apresentação pélvica: forma completa, modo de nádegas e a forma incompleta, sendo a mais frequente a forma de nádegas.
- c) São condições predisponentes: polidrâmnia, prematuridade e óbito fetal.

É(são) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) a, b e c.
- (B) Apenas b e c.
- (C) Apenas a e c.
- (D) Apenas a e b.
- (E) Apenas a.

QUESTÃO 03.

Para a avaliação fetal durante o trabalho de parto, o toque vaginal permite identificar a apresentação fetal e seus pontos de reparo. Em qual dos itens essa correlação está incorreta:

- (A) Cefálica defletida de 1^o grau = Ângulo anterior do bregma.
- (B) Cefálica defletida de 3^o grau = Queixo.
- (C) Cefálica defletida de 2^o grau = Raiz do nariz.
- (D) Cefálica fletida = Lambda.
- (E) Pélvica = Acrômio.

QUESTÃO 04.

No estudo dopplervelocimétrico obstétrico, considere os itens abaixo:

- a) A obtenção do índice de pulsatilidade da artéria umbilical é resultado da equação: $\text{sístole} - \text{diástole} / \text{velocidade média}$.
- b) A avaliação do sonograma da artéria umbilical deve, preferencialmente, ser realizada próximo à inserção do cordão umbilical.

- c) A função placentária pode ser investigada por meio do sonograma das artérias uterinas.

É(são) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas a.
- (B) Apenas b e c.
- (C) a, b e c.
- (D) Apenas a e b.
- (E) Apenas c.

QUESTÃO 05.

No estudo da vitalidade fetal através da dopplervelocimetria, considere os itens abaixo:

- a) O fluxo diastólico ausente ou reverso na artéria umbilical ocorre quando pelo menos 70% da vasculatura placentária encontra-se lesionada.
- b) Alteração no espectro de fluxo no ducto venoso é considerado um marcador de acidose ao nascimento.
- c) A velocidade máxima do fluxo da artéria cerebral média não é preditiva de anemia fetal.

É(são) incorreto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas a.
- (B) Apenas a e c.
- (C) Apenas b.
- (D) Apenas c.
- (E) Apenas b e c.

QUESTÃO 06.

A Cardiotocografia para estudo das condições de bem estar fetal considera os seguintes parâmetros, exceto:

- (A) Acelerações transitórias.
- (B) Movimentos respiratórios fetais.
- (C) Desacelerações da frequência cardíaca.
- (D) Linha de base da frequência cardíaca.
- (E) Variabilidade da frequência cardíaca.

QUESTÃO 07.

Na fisiopatologia da Pré-eclâmpsia são considerados corretos os itens, exceto:

- (A) O vasoespasmo pode ser atribuído a uma perda da refratariedade à angiotensina II.
- (B) Há um predomínio de tromboxano (TXA₂) em relação às prostacilinas (PGI₂).
- (C) A proteinúria parece ser decorrente da tumefação das células endoteliais do glomérulo, acúmulo de lipídeos e deposição de material fibrinoide entre a lâmina basal e as

células endoteliais.

- (D) A diminuição da taxa de filtração glomerular torna a mensuração do ácido úrico sérico sem importância clínica no manejo da doença.
- (E) A anemia microangiopática pode ser determinada pela pesquisa de esquizócitos no sangue periférico.

QUESTÃO 08.

Considerando a rotura prematura de membranas ovulares;

- a) As três principais complicações da rotura prematura de membranas pré-termo de origem fetal são: infecção neonatal, prematuridade e hipoplasia pulmonar.
- b) O teste de verificação do pH vaginal não é útil para o diagnóstico, uma vez que o líquido amniótico é naturalmente alcalino.
- c) São fatores de risco para uma maior chance de infecção ovular: líquido meconial, duração do trabalho de parto maior que 12 horas e rotura prematura de membranas maior que 24 horas.

É(são) incorreto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas a.
(B) Apenas a e b.
(C) Apenas b.
(D) Apenas c.
(E) Apenas b e c.

QUESTÃO 09.

Assinale como verdadeiro (V) ou falso (F) as assertivas abaixo relacionadas à assistência pré-natal:

- a) Valores de hemoglobina menores que 11g/dL são considerados indicativos de anemia materna.
- b) Leucocitose é um achado comum na gestação. Valores até 14.000 mm³ devem ser interpretados cautelosamente.
- c) O ganho ponderal médio ideal para a gestante é de aproximadamente 12,5kg. Para as gestantes obesas o ganho ponderal máximo recomendado é de 9,1kg.
- d) As vacinas direcionadas à hepatite B, Raiva e meningococo não são contraindicadas na gestação.
- e) Recomenda-se a suplementação de 300 mg/dia de ferro elementar e 400mg/dia de folato para todas as gestantes.

- (A) F F V V F
(B) V V V V F
(C) V V F F V
(D) F V F V F
(E) F V F F F

QUESTÃO 10.

Sobre a placenta prévia:

- a) Placenta increta refere-se à placenta que invade a serosa uterina.
- b) Sucessivas cesarianas não representam fator de risco para o acretismo placentário.
- c) São condições comuns e associadas à placenta prévia: apresentação fetal anômala e amniorrexe prematura.

É(são) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas a.
(B) Apenas b.
(C) Apenas a, b e c.
(D) Apenas a e c.
(E) Apenas c.

QUESTÃO 11.

Na pré-eclâmpsia, deve-se avaliar laboratorialmente, exceto:

- (A) Amilase
(B) Hematócrito
(C) Trombofilias
(D) Bilirrubinas
(E) Esquizócitos

QUESTÃO 12.

Na Restrição de Crescimento Intrauterino (RCIU):

- a) O corioangioma, o diabetes mellitus e a gestação gemelar são considerados fatores de risco.
- b) Na forma assimétrica da RCIU, a condição fisiopatológica está relacionada à fase hiperplásica das células fetais.
- c) A diminuição no armazenamento do glicogênio hepático está relacionada à forma simétrica da RCIU.

É(são) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas b.
(B) Apenas a.
(C) Apenas a, b e c.
(D) Apenas a e b.
(E) Apenas b e c.

QUESTÃO 13.

A predição do parto prematuro pode ser estabelecida pelos seguintes métodos, exceto:

- (A) Medida do colo uterino.
(B) Pesquisa da interleucina-6 no líquido amniótico.

- (C) Pesquisa do estriol plasmático.
- (D) Dosagem da alfafetoproteína.
- (E) Pesquisa da fibronectina fetal.

QUESTÃO 14.

Considerando a prematuridade:

- a) As drogas beta-adrenérgicas e os bloqueadores de canais de cálcio podem ser usados como uterolíticos.
- b) São contraindicações à tocolise: anemia falciforme, hipertireodismo e amniorrexe prematura.
- c) O sangramento decidual e a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal são mecanismos envolvidos na fisiopatologia da prematuridade.

É(são) correto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas b.
- (B) Apenas a.
- (C) Apenas a, b e c.
- (D) Apenas a e b.
- (E) Apenas c.

QUESTÃO 15.

Considere as assertivas abaixo:

- a) O colostro é mais denso que o leite, rico em lipídeos e com baixo teor de proteínas. A Ejeção do leite se dá pela ativação das células mioepiteliais dos alvéolos pela ocitocina.
- b) A produção do líquido amniótico tem a contribuição da urina e fluido pulmonar fetal.
- c) A resistência insulínica observada na gestação deve-se ao cortisol e lactogênio placentário.

É(são) incorreto(s) o(s) item(ns):

- (A) Apenas a.
- (B) Apenas a e b.
- (C) Apenas a e c.
- (D) Apenas b.
- (E) Apenas c.

QUESTÃO 16.

Para que a amostra da Citologia Cérvico-Vaginal seja considerada satisfatória na sua análise de prevenção do câncer de colo uterino, o que deve ser observado?

- (A) Índice colposcópico de Reid.
- (B) Índice de maturação estrogênica.
- (C) A presença de componentes da ZT (células metaplásicas endocervicais ou escamosas, ou ambas).
- (D) Presença de Células-chave.

- (E) Uso de "CellSaver".

QUESTÃO 17.

Qual exame pode visualizar a permeabilidade das tubas uterinas?

- (A) Histeroscopia.
- (B) Histerossalpingografia.
- (C) Laparoscopia.
- (D) Salpingostomia.
- (E) Ultrassonografia transvaginal.

QUESTÃO 18.

Qual a conduta frente a um resultado de "Lesão de Alto Grau" em uma biopsia de Colo Uterino?

- (A) Colposcopia.
- (B) Histeroscopia.
- (C) Histerectomia.
- (D) Conização.
- (E) Amputação do colo uterino.

QUESTÃO 19.

Qual exame deve ser feito diante de espessamento endometrial em uma mulher menopausada?

- (A) Histerectomia extrafascial.
- (B) Video-histeroscopia com biópsia dirigida.
- (C) Histerectomia tipo II.
- (D) Histerectomia simples.
- (E) Histerectomia tipo III.

QUESTÃO 20.

No exame a fresco da secreção vaginal, quais organismos de interesse clínico podem ser vistos?

- (A) Candida, Gardnerella vaginalis, Streptococos do Grupo B.
- (B) Klebsiella, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis.
- (C) Candida, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis.
- (D) Candida, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis.
- (E) Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis.

QUESTÃO 21.

Qual é o teste para identificar as lesões acetobranças?

- (A) Teste de Q-tip.
 - (B) Teste de Whiff.
 - (C) Teste de Sims-Huhner.
 - (D) Teste Tríplice.
 - (E) Teste do ácido-acético.
-

QUESTÃO 22.

Qual o exame padrão ouro para diagnosticar endometriose da cavidade pélvica e peritoneal?

- (A) Ultrassonografia Abdominal.
 - (B) Dosagem sérica de CA125.
 - (C) Videolaparoscopia diagnóstica com biópsia dirigida.
 - (D) Dosagem sérica de CA19-9.
 - (E) Tomografia abdominal.
-

QUESTÃO 23.

Quais dois exames laboratoriais podem ser usados para comprovar a parada do funcionamento dos ovários?

- (A) Estradiol e FSH.
 - (B) Estriol e LH.
 - (C) Estrona e FSH.
 - (D) LH e FSH.
 - (E) Estradiol e LH.
-

QUESTÃO 24.

Os exames, abaixo, podem ser usados para investigação da ovulação durante um ciclo menstrual, exceto.

- (A) Dosagem da progesterona sérica mesolútea.
 - (B) Ultrassonografia para controle da ovulação.
 - (C) Citologia cérvico-vaginal.
 - (D) Gráfico da temperatura basal do corpo.
 - (E) Biópsia endometrial.
-

QUESTÃO 25.

Qual o nome do teste que tem a finalidade de demarcar áreas de epitélio escamoso cérvico-vaginal (rico em glicogênio)?

- (A) Teste de fita adesiva, Scotch.
 - (B) Teste de Papanicolaou.
 - (C) Teste de Collins.
 - (D) Teste de Frost.
 - (E) Teste de Schiller.
-

QUESTÃO 26.

Qual(is) a(s) etiologia(s) da puberdade precoce periférica(s)?

- (A) Hiperplasia adrenal congênita.
 - (B) Tumores do sistema nervoso central.
 - (C) Trauma craniano.
 - (D) Síndrome da sela vazia.
 - (E) Cistos aracnóides ou supraselares.
-

QUESTÃO 27.

Sobre a eversão vaginal pós-histerectomia e a qualificação de prolapso de órgão pélvico (POP-Q) - Sistema de estágios da suspensão de órgão pélvico é correto, exceto:

- (A) Estádio 0, apesar do prolapso, não há queixas.
 - (B) Estádio I, a porção mais distal do prolapso encontra-se > 1cm acima do nível do hímen.
 - (C) Estádio II, a porção mais distal do prolapso encontra-se < ou = a 1cm proximal ou distal do plano do hímen.
 - (D) Estádio III, a porção mais distal do prolapso encontra-se > 1cm abaixo do plano do hímen, mas não apresenta uma protusão maior que 2cm menos que o comprimento vaginal total em centímetros.
 - (E) Estádio IV, essencialmente, observa-se eversão completa do comprimento total do trato genital inferior.
-

QUESTÃO 28.

Sobre a classificação da fístula geniturinária é correto, exceto:

- (A) Tipo 1: borda distal da fístula > 3,5 cm do meato urinário externo.
 - (B) Tipo 2: borda distal da fístula > 2,5-3,5 cm do meato urinário externo.
 - (C) Tipo 3: borda distal da fístula > 1,5-2,5 cm do meato urinário externo.
 - (D) Tipo 4: borda distal da fístula < 1,5 cm do meato urinário externo.
 - (E) Sobre o tamanho da fístula, não é realizada a medição do seu maior diâmetro.
-

QUESTÃO 29.

Sobre o procedimento de excisão eletrocirúrgica com alça, pode-se dizer, exceto:

- (A) Perfil de segurança favorável.
 - (B) Procedimento ambulatorial sob anestesia local.
 - (C) Dano térmico não obscurece a condição da margem amostrada.
 - (D) Procedimento fácil e de baixo custo.
 - (E) Amostra de tecido para avaliação histopatológica.
-

QUESTÃO 30.

Sobre o câncer de vulva tipo 1, é correto dizer, exceto:

- (A) Idade mais jovem (35-65 anos).
- (B) Baixa associação com neoplasia cervical.
- (C) Cofatores: estado imunológico, integração viral.
- (D) Alta incidência de tabagismo.
- (E) NIV como lesão preexistente.